

Stammdaten Transport		
Transportbeginn Monat / Jahr / ☐ Wochentag ☐ Feiertag / Wochenende Transportstart Uhr Transportende Uhr Dringlichkeit ☐ Notfall ☐ innerhalb von 2h ☐ im Tagesverlauf disponibel ☐ disponibel		
Quellklinik Verlegende Fachrichtung ☐ Pädiatrie ☐ Kinderchirurgie ☐ Innere Medizin ☐ Chirurgie ☐ Anästhesie ☐ Andere Station ☐ Normalstation (Kinder) ☐ IMC ☐ Normalstation (Erwachsene) ☐ PICU ☐ Erwachsenen-ICU ☐ NICU ☐ Bildgebung/Endoskopie ☐ OP/AWR ☐ Notaufnahme/Schockraum	Zielklinik Station ☐ PICU ☐ NICU ☐ Erwachsenen-ICU ☐ IMC ☐ Normalstation ☐ OP / Herzkatheter / Notfallintervention ☐ Notaufnahme / Schockraum ☐ Andere	

Patientin / Patient		
Patientenalter Jahre Monate, wenn ≤ 1 Jahr Geschlecht ☐ Weiblich ☐ Männlich ☐ Divers ☐ Unbekannt Gewicht kg Isolationsbedarf? ☐ Ja ☐ Nein	Führendes Symptom, das zum Transport geführt hat <i>(Nur eine Antwortmöglichkeit wählen)</i> ☐ Respiratorisch ☐ Kardiologisch ☐ Neurologisch ☐ Nephrologisch ☐ Gastroenterologisch ☐ Dermatologisch ☐ Muskuloskelettal ☐ Blutbildendes/lymphatisches System ☐ Unbekannt ☐ Sonstige:	Ursache für das führende Symptom, das zum Transport geführt hat <i>(Nur eine Antwortmöglichkeit wählen)</i> ☐ Infektiologisch ☐ Immunologisch / rheumatologisch ☐ Onkologisch / hämatologisch ☐ Transplant (solide Organe) ☐ Transplant (Knochenmark) ☐ Metabolisch / endokrinologisch ☐ Traumatologisch / chirurgisch ☐ Verbrennung / Verbrühung / Verätzung ☐ Unbekannt ☐ Sonstige:

Vitalparameter bei Übernahme		
Blutdruck (MAD): mmHg Sauerstoffsättigung (SpO₂): % FiO₂ zum Zeitpkt. SpO₂-Messung: % <i>Anm.: O₂-Gabe über Nasenbrille: FiO₂ = 30%; über Maske ohne Reservoir: FiO₂ = 50%; über Maske mit Reservoir: FiO₂ = 90%</i>	Wurde eine BGA durchgeführt? ☐ Ja ☐ Nein Abnahmeort: ☐ Arteriell ☐ Kapillär ☐ Venös pH: BE: mmol/l pCO ₂ : ☐ kPa ☐ mmHg Laktat: mmol/l pO ₂ : ☐ kPa ☐ mmHg	

Subjektive Krankheitsschwere des Kindes nach Übernahme	
☐ NACA 0	keine Störung
☐ NACA 1	geringfügige Störung (keine akute ärztliche Therapie)
☐ NACA II	mäßigschwere Störung (ambulante Abklärung)
☐ NACA III	schwere, aber nicht vitalbedrohliche Störung (stationäre Therapie)
☐ NACA IV	akute Lebensgefahr nicht auszuschließen
☐ NACA V	akute Lebensgefahr (ohne baldige Therapie wahrscheinl. letal)
☐ NACA VI	Reanimation
☐ NACA VII	Tod

PÄDIATRISCHES INTENSIVTRANSPORT - REGISTER (seite 2)

Transportmittel / -besatzung	
Rettungsmittel ☐ RTW ☐ RTW mit Zusatzausstattung ☐ ITW ☐ RTH ☐ ITH ☐ Andere _____	Zusatzausstattung durch Transportteam mitgebracht? ☐ Ja ☐ Nein Art des Transportteams? ☐ Stammbesetzung ☐ Pädiatrisches Intensivteam ☐ Stammbesetzung Rettungsmittel plus Pädiatrie ☐ Neonatologisches Intensivteam ☐ Andere _____
Pädiater*in Teil des Transportteams? ☐ Ja ☐ Nein <i>Nein → (Weitere) Ärztin / Arzt</i> Teamleitung? ☐ Ja ☐ Nein Teil der Stammbesetzung? ☐ Ja ☐ Nein Ausbildungsstand: ☐ Fachärztin/-arzt ☐ Assistenzärztin/-arzt ≥ 3 Jahre WB-Zeit ☐ Assistenzärztin/-arzt < 3 Jahre WB-Zeit (Zusatz)Qualifikation(en): ☐ Intensivmedizin ☐ Neonatologie ☐ (Kinder)Kardiologie ☐ Notfallmedizin ☐ EPALS/PALS ☐ DIVI-Intensivtransportkurs	(Weitere) Ärztin / Arzt Teil des Transportteams? ☐ Ja ☐ Nein Fachrichtung: ☐ Innere Medizin ☐ Chirurgie ☐ Anästhesie ☐ Andere _____ Teamleitung? ☐ Ja ☐ Nein Teil der Stammbesetzung? ☐ Ja ☐ Nein Ausbildungsstand: ☐ Fachärztin/-arzt ☐ Assistenzärztin/-arzt ≥ 3 Jahre WB-Zeit ☐ Assistenzärztin/-arzt < 3 Jahre WB-Zeit (Zusatz)Qualifikation(en): ☐ Intensivmedizin ☐ Kardiologie ☐ Notfallmedizin ☐ EPALS/PALS ☐ DIVI-Intensivtransportkurs
	Intensivpflege Teil des Transportteams? ☐ Ja ☐ Nein (Zusatz)Qualifikation(en): ☐ Fachpflege Intensivmedizin / Anästhesie ☐ EPALS/PALS ☐ DIVI-Transportkurs Kardiotechniker Teil des Transportteams? ☐ Ja ☐ Nein Eltern / Bezugsperson auf Transport ☐ Ja ☐ Nein, nicht vor Ort ☐ Nein, Eltern wünschten keine Begleitung ☐ Nein, Eltern durften nicht begleiten ☐ Nein, keine Begleitung aus Platzgründen

Interventionen	vorbestehend	Transportteam	nach Übergabe	nicht erfolgt
A/B-Maßnahmen Sauerstofftherapie High-Flow-Nasal-Cannula-Therapie (HFNC) Nicht-invasive Beatmung (CPAP, NIV) Invasive Beatmung Thoraxdrainage Stickoxid (NO)-Gabe ECMO	☐	☐	☐	☐
C-Maßnahmen Peripherer Zugang Zentralvenöser Zugang Intraossärer Zugang Arterielle Blutdruckmessung Katecholamingabe Transfusion von Blutprodukten Antiarrhythmika Notfall-Pacer Kardioversion / Defibrillation	☐	☐	☐	☐
D-Maßnahmen Analgetika Sedativa Muskelrelaxantien Antiepileptika (Akuttherapie) Hirndrucksonde (EVD / Parenchymsonde)	☐	☐	☐	☐
E-Maßnahmen ☐ Blasendauerkatheter ☐ Andere Drainagen	☐	☐	☐	☐
Reanimationsmaßnahmen ☐ Kardiopulmonale Reanimation ☐ Extrakorporaler Life Support (ECLS)	☐	☐	☐	☐

Gab es auf dem Transport Probleme? ☐ Keine ☐ Akzidentielle Extubation ☐ Versagen der maschinellen Beatmung (z.B. Gasflasche leer) ☐ Verlust des Gefäßzugangs	☐ HerzKreislaufversagen ☐ Dosierungsfehler Medikamente ☐ Gerätedefekt / Geräteinkompatibilität ☐ Andere: _____
---	---